

# Около теоремата на Наполеон

Владимир Георгиев, Олег Мушкаров

## 1 Теоремата на Наполеон-малко история

Известно е, че Наполеон е бил любител на елементарната математика и е познавал редица известни математици. Например, негов приятел е бил италианският математик Лоренцо Маскерони, който пръв разглежда задачи за геометрични построения, използващи само пергел. Интересна задача на Наполеон в тази насока е да се построи центърът на дадена окръжност само с пергел. Тук няма да се спираме на нейното решение, а ще отбележим само, че по времето на Ренесанса (1300г.-1600г.) подобни задачи са възниквали от чисто практически въпроси. Ето няколко примера на важни изобретения и открития от този период:


- Механичният часовник;
- Артилерията - първото оръдие за изстрелване на ракети е изобретено от английския инженер Уилям Конгреив (1670 - 1729);
- Печатната преса - изобретена е от Йоханес Гутенберг през 1440 г.;
- Компаса - за първи път е използван от китайския пътешественик Ченг Хе(1371-1435);
- Микроскопа - изобретен е от холандския майстор на очила Ханс Янсен през 1590 г.;
- Тапетите - първата фабрика за хартия е построена в Англия през 1496 г.;
- Подводницата - първият проект е на Леонардо да Винчи, но за първи път подводница е построена от Корнелиус ван Дребел през 1624 г.;
- Кибритът - открит е от Роберт Бойл през 1680 г.;
- Очилата - първите очила са разработени от италианския изобретател Салвино Д'Амате през 1284 г.

Важността на тези изобретения и фактът, че те съществено са променили реалния живот на хората обясняват защо някои известни математически задачи от този период са свързани с решаването на нови практически проблеми.

Друг пример е следното предизвикателство на П.Ферма(1601-1665) към Е. Торичели (1608-1647), изобретателя на барометъра: *Да се намери точка в равнината на даден триъгълник, за която сумата на разстоянията и до върховете на триъгълника е минимална.* Торичели дава няколко решения на тази екстремална геометрична

задача. В едно от тях той отбелязва, че окръжностите, описани около равностранните триъгълници, построени външно върху страните на триъгълника се пресичат в една точка, която дава решение на задачата. В съвременната математическа литература тази точка се нарича точка на Торичели-Ферма на дадения триъгълник.

Редица забележителни математически твърдения се приписват на Наполеон Бонапарт (1769-1821), въпреки че в известните ни източници връзката му с тях се поставя под въпрос. Трябва да се отбележи обаче, че математиката разцъфтява в следреволюционна Франция и по това време математиците се радват на голямо уважение. Например известният математик Лаплас е бил министър на вътрешните работи при Наполеон.



Фигура 1: Теорема на Наполеон

Следното твърдение (известно като теорема на Наполеон) е тясно свързано със задачата на Ферма (виж [14]), формулирана по-горе.

**Теорема 1.1.** *Върху страните на триъгълник са построени външно (вътрешно) равностранни триъгълници. Да се докаже, че техните центрове са върхове на равностранен триъгълник.*

Наистина е изненадващо, че видът на получения триъгълник не зависи от вида на първоначалния триъгълник. Но той зависи от вида на построените върху страните триъгълници—той е равностранен винаги когато построените триъгълници са такива. Съответният Geogebra файл може да се намери в следния линк Теорема на Наполеон.

Това е нашата изходна точка, като главната ни цел е разработването на конкретни дидактични материали (на базата на системата Geogebra), които могат да се използват в:

- курсове за подготовка и повишаване на квалификацията на настоящи и бъдещи учители по математика;
- класната работа.

Нашият интерес към теоремата на Наполеон е предизвикан и от факта, че тя не е много известна сред италианските учители по математика.

## 2 GeoGebra симулации около теоремата на Наполеон

Ние използваме системата Geogebra, защото тя дава приятен и лесен начин за чертане на разнообразни геометрични конфигурации.

В динамичното приложение точките  $A, B, C$  могат да се движат произволно като върхове на триъгълник. То може да се активира на следния линк Теорема на Наполеон. Приложението е подготвено съвместно със студентката Сара Леал Венегас в математическата лаборатория *Съставяне на задачи*, организирана в Университета на Пиза през пролетта на 2011 г.

Като първи пример на въпрос, който може да се постави при използването на динамичната конструкция предлагаме следния:

- Вярно ли е, че отношението на лицата на  $\triangle JKL$  и  $\triangle ABC$  на Фигура 1 е постоянно?

На този въпрос може лесно да се отговори като се използва Geogebra. Движейки точката  $A$  така, че в крайното положение точките  $A, B, C$  да са колинеарни виждаме, че лицето на  $\triangle JKL$  може да остане постоянно, докато лицето на  $\triangle ABC$  клони към 0. Следователно отговорът е отрицателен.

Друг въпрос, свързан с горния, е следния:

- Да се намери лицето на  $\triangle JKL$  или еквивалентно, да се намери неговата страна.

Този пример показва как може да "скочим" от приложения на Geogebra към по-абстрактни въпроси, които се нуждаят от чисто математическа обосновка и изчисления без използване на ИТ средства.

Връщайки се към теоремата на Наполеон ще отбележим, че в лабораторията за съставяне на задачи бяха изследвани следните варианти за нейното обобщаване:

- вместо равностранни триъгълници външно се строят квадрати;
- вместо триъгълници се разглеждат четириъгълници.

В първия случай отговорът беше намерен бързо с прилагане на системата Geogebra (виж Фигура 2),


която може да се активира чрез следния линк Теорема на Наполеон с квадрати. Както се вижда, при приближаване на точките  $B$  и  $A$  (виж Фигура 3)  $\triangle KLJ$  става близък до правоъгълен, тоест не е равностранен.

Като използваме същото приложение виждаме, че медицентровете на триъгълниците  $ABC$  и  $JKL$  съвпадат. Наистина, следвайки подхода от Упражнение 5.2 изразяваме комплексните числа, съответстващи на точките  $L, K, J$  от Фигура 3, както следва


$$l = \left(\frac{1 \pm i}{2}\right)b + \left(\frac{1 \mp i}{2}\right)c, \quad k = \left(\frac{1 \pm i}{2}\right)c + \left(\frac{1 \mp i}{2}\right)a, \quad (1)$$

$$j = \left(\frac{1 \pm i}{2}\right)a + \left(\frac{1 \mp i}{2}\right)b. \quad (2)$$

Сега лесно се проверява, че  $l + k + j = a + b + c$ , т.е. медицентровете на  $\triangle LKJ$  и  $\triangle ABC$  съвпадат. Тъй като триъгълниците  $\triangle BCL$ ,  $\triangle CAK$  и  $\triangle ABJ$  са равнобедрени и правоъгълни можем да формулираме следния въпрос:



Фигура 2: Geogebra замества триъгълници с квадрати



Фигура 3: Geogebra контрапример за обобщаване на теоремата на Наполеон

- Съществуват ли триъгълници  $ABC$ , за които  $\triangle LKJ$  е равнобедрен и правоъгълен?

Предната динамична конструкция с Geogbra подсказва следния отговор:

**Лема 2.1.** *Не съществува  $\triangle ABC$ , за който  $\triangle LKJ$  е равнобедрен и правоъгълен.*

**Доказателство.** Да допуснем, че  $\triangle LKJ$  е равнобедрен и правоъгълен. Тогава

$$j = \frac{1 \mp i}{2}l + \frac{1 \pm i}{2}k.$$

Замествайки (1) и (2) в това равенство получаваме  $\frac{i}{2}(a-b) = 0$ , което е противоречие.

Друг естествен въпрос е следния:


- Съществуват ли триъгълници  $ABC$ , за които  $\triangle LKG$  е равностранен?

Читателят може да използва Лема 5.1 за да реши следното:

**Упражнение 2.1.** Триъгълник  $LKJ$  е равностранен само когато  $\triangle ABC$  е равностранен.

По-интересен е въпросът кога  $\triangle LJK$  е правоъгълен. След тестване с Geogebra можем да формулираме следната хипотеза:

**Твърдение 2.1.** Триъгълник  $LKJ$  е правоъгълен с  $\sphericalangle LJK = 90^\circ$  тогава и само тогава, когато квадратите са вътрешни за триъгълника и върховете  $A$  и  $B$  на  $\triangle ABC$  лежат върху правите, определени от страните  $LJ$  и  $KJ$  на  $\triangle LKJ$ .



Фигура 4: Правоъгълни триъгълници  $LKJ$  с положителна ориентация

**Доказателство.** Нека  $\triangle ABC$  е ориентиран в отрицателна посока, тоест по часовниковата стрелка (виж Фигура 4) и да предположим, че точките  $L, K, J$  (центровете на вътрешните квадрати) са такива, че  $\triangle BCL$ ,  $\triangle CAK$  и  $\triangle ABJ$  са ориентирани в същата посока. Като използваме Упражнение 5.4 заключаваме, че

$$l = \frac{1-i}{2}c + \frac{1+i}{2}b,$$

$$k = \frac{1-i}{2}a + \frac{1+i}{2}c,$$

$$j = \frac{1-i}{2}b + \frac{1+i}{2}a.$$

Условието, че  $\triangle LKJ$  е правоъгълен, означава, че (виж Упражнение 5.3)


$$j = \frac{\lambda^2 - i\lambda}{1 + \lambda^2}l + \frac{1 + i\lambda}{1 + \lambda^2}k,$$

като  $\lambda > 0$ , ако  $\triangle LKJ$  е ориентиран в положителна посока (Фигура 4) и  $\lambda < 0$  – в обратния случай (Фигура 5). От горните равенства следва, че

$$a - l = \lambda(j - l)$$

и значи  $A$  лежи върху правата  $JL$ . Аналогично заключаваме, че точката  $B$  е върху правата  $JK$ .

Предлагаме на читателя да докаже обратното твърдение.



Фигура 5: Правоъгълни триъгълници  $LKJ$  с отрицателна ориентация

### 3 Доказателство на теоремата на Наполеон с комплексни числа

Сега сме готови да завършим доказателството на теоремата на Наполеон. Използвайки означенията на Фигура 1 и Лема 5.2, получаваме

$$l = w_1b + w_2c, \quad k = w_1c + w_2a, \quad j = w_1a + w_2b, \quad (3)$$

където

$$w_1 = \frac{z_1 + 1}{3}, \quad w_2 = \frac{z_2 + 1}{3}.$$

От тези равенства следва, че медицентровете на  $\triangle LKJ$  и  $\triangle ABC$  съвпадат, защото от (11) и (3) получаваме,

$$l + k + j = a + b + c.$$

Без ограничение можем да предпологаме, че

$$a + b + c = 0, \quad (4)$$

което влече

$$l + j + k = 0.$$

Нашата цел е да покажем, че

$$l = z_1 j + z_2 k, \quad (5)$$

защото от Лема 5.1 ще следва, че  $\triangle IGH$  е равностранен. От друга страна, като заместим  $l, k, j$  от равенство (3) в (5), получаваме

$$-(z_1 w_1 + z_2 w_2)a + (w_1 - z_1 w_2)b + (w_2 - z_2 w_1)c = 0. \quad (6)$$

Сравнявайки това равенство с (4), виждаме, че

$$-(z_1 w_1 + z_2 w_2) = (w_1 - z_1 w_2) = (w_2 - z_2 w_1)$$

и като вземем предвид равенствата

$$w_1 = \frac{z_1 + 1}{3}, w_2 = \frac{z_2 + 1}{3}, z_1 + z_2 = 1,$$

заклучаваме, че е достатъчно да проверим равенствата

$$-z_1^2 - z_2^2 - 1 = 1 - z_1 z_2 = 1 - z_1 z_2. \quad (7)$$

Те са изпълнени, защото от (10), получаваме

$$-z_1^2 - z_2^2 - 1 = z_2 + z_1 - 1 = 0, \quad 1 - z_1 z_2 = 1 - 1 = 0.$$

Следователно равенството (7) е изпълнено и теоремата на Наполеон е доказана.

## 4 Някои обобщения на теоремата на Наполеон

Теоремата на Наполеон има редица обобщения. Например, построените триъгълници могат да имат произволна форма, т.е. да са подобни и еднакво ориентирани. Тогава техните медицентрове образуват подобен на тях триъгълник. В действителност не е необходимо да разглеждаме медицентровете. За произволен  $\triangle ABC$  разглеждаме три външни точки  $A_1, B_1, C_1$ , за които


$$\sphericalangle AC_1 B + \sphericalangle BA_1 C + \sphericalangle CB_1 A = 360^\circ$$

Тогава  $\triangle A_1 B_1 C_1$  е подобен на триъгълник с ъгли

$$\sphericalangle C_1 A B + \sphericalangle B_1 A C, \sphericalangle C_1 B A + \sphericalangle A_1 B C, \sphericalangle A_1 C B + \sphericalangle B_1 C A.$$

Доказателството на този интересен факт може да се намери например в ([12], стр. 178-181) и [5].

Директно обобщение на теоремата на Наполеон е получено първо от Барлоти [1] в 1955 г. и след това от Гребер [6] в 1980 г. То гласи, че ако върху страните на  $n$ -ъгълник  $P$  се построят външно(вътрешно) правилни  $n$ -ъгълници, то техните центрове са върхове на правилен  $n$ -ъгълник тогава и само тогава, когато  $P$  е афинно-правилен многоъгълник, т.е. той е образ на правилен  $n$ -ъгълник при афинна трансформация на равнината. В следващото упражнение предлагаме на читателя да докаже теоремата на Барлоти-Гребер в случая  $n = 4$ .



Фигура 6: Четириъгълници и теорема на Наполеон

**Упражнение 4.1.** *Върху страните на четириъгълник външно са построени квадрати. Да се докаже, че:*

(а) *Центровете на квадратите са върхове на четириъгълник с равни и перпендикулярни диагонали.*

(в) *Центровете на квадратите са върхове на квадрат тогава и само тогава, когато първоначалният четириъгълник е успоредник.*

**Упътване.** Нека  $a, b, c, d$  са комплексните числа, съответстващи на върховете на четириъгълника. За да докажете (а) изразете комплексните числа на центровете  $M, N, P, Q$  на квадратите чрез  $a, b, c, d$  и покажете, че  $n - q = i(m - p)$ . За (в) използвайте, че  $MP \perp NQ$  за да заключите, че  $MNPQ$  е квадрат точно когато  $MN \parallel PQ$ . Сега изразете това условие чрез  $a, b, c, d$ .

Накрая ще разгледаме едно обобщение на теоремата на Наполеон, мотивирано от Упражнение 2.1 .

**Упражнение 4.2.** *Върху страните на неравностраниен триъгълник са построени външно правилни  $n$ -ъгълници. Да се докаже, че техните центрове са върхове на равностраниен триъгълник само при  $n = 3$ .*

**Упътване.** Докажете и след това използвайте факта, че комплексните числа  $a, b, c$  са върхове на равностраниен триъгълник тогава и само тогава, когато  $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ .



## 5 Допълнение: Комплексни числа и геометрия

Една от основните трудности за първокурсниците в университетите е курсът (курсовете) по математика и по-конкретно липсата на опит за работа с тригонометрични функции и комплексни числа. Използването на последните при подготовката на бъдещите учители е сведено до минимум поради утвърденото мнение, че това е алгоритъм, който, макар и не много ясен, работи чрез прилагане само на формални алгебрични пресмятания.

По долу са изложени някои стандартни факти, използвани в предишните параграфи. Основната идея при използването на комплексните числа в геометрията е, че всяка точка  $A$  в равнината може да се отъждестви с комплексно число, което ще означаваме със същата малка буква  $a$ . Ако комплексното число  $a \in \mathbb{C}$  е умножено с реално число  $\lambda > 0$ , то трансформацията

$$a \in \mathbb{C} \Rightarrow \lambda a \in \mathbb{C}$$

е хомотетия с център началото  $O$  и коефициент  $\lambda$ . Аналогично умножението с  $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$  дефинира ротация на ъгъл  $\varphi$  с център  $O$ . Ще отбележим, че въртенето на ъгъл  $\varphi$  се извършва в положителна посока, т.е. обратно на часовниковата стрелка.

Всеки  $\triangle ABC$  определя равенство от вида

$$a = z_1 b + z_2 c, \quad z_1 + z_2 = 1, \quad (8)$$

където  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ .

Ясно е, че коефициентите  $z_1, z_2$  са еднозначно определени ако  $B \neq C$ . Наистина, ако

$$z_1 b + z_2 c = \tilde{z}_1 b + \tilde{z}_2 c$$

и

$$z_1 + z_2 = \tilde{z}_1 + \tilde{z}_2 = 1$$

то

$$(z_1 - \tilde{z}_1)b = (\tilde{z}_2 - z_2)c.$$

Тъй като  $b \neq c$  и  $z_1 - \tilde{z}_1 = \tilde{z}_2 - z_2$ , получаваме

$$z_1 = \tilde{z}_1, z_2 = \tilde{z}_2. \quad (9)$$

В сила е следната

**Лема 5.1.**  $\triangle ABC$  е равностраничен точно когато равенството (8) е изпълнено при

$$z_1 = \frac{1}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2}, z_2 = \overline{z_1}.$$

**Доказателство.** Можем да предположим, че комплексното число

$$m = \frac{b+c}{2},$$

отговарящо на средата на отсечката  $BC$  е числото  $0$ . Тогава в зависимост от ориентацията на  $\triangle ABC$  имаме

$$a = \pm i \tan 60^\circ b = \pm i \sqrt{3} b,$$

тъй като  $A$  се получава с ротация на  $\pm 90^\circ$  (т.е. умножение по  $\pm i$ ) и хомотетия (т.е. с умножение) с коефициент  $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ .

**Забележка 5.1.** Числата  $z_1, z_2$  са комплексните корени на уравнението  $z^3 = 1$  и изпълняват равенствата

$$z_1 + z_2 = 1, z_1 z_2 = 1, z_1^2 = -z_2, z_2^2 = -z_1. \quad (10)$$

**Забележка 5.2.** Равенствата (8) са много полезни и могат да се използват за получаване на различни версии на класическата теорема на Наполеон.

**Упражнение 5.1.** Да се намерят необходими и достатъчни условия в термините на коефициентите  $z_1, z_2$  в (8) така, че  $\triangle ABC$  да е правоъгълен с  $\sphericalangle A = 90^\circ$ .

**Упътване.**  $\triangle ABC$  е правоъгълен с  $\sphericalangle A = 90^\circ$  точно когато

$$c - a = (b - a)i\lambda$$

за реално число  $\lambda \neq 0$ . От това равенство и (8) следва, че

$$(z_1 - i\lambda z_1 + i\lambda)(c - b) = 0,$$

откъдето

$$z_1 - i\lambda z_1 + i\lambda = 0.$$

**Отговор.**

$$z_1 = \frac{\lambda^2 - i\lambda}{1 + \lambda^2}, z_2 = 1 - z_1 = \frac{1 + i\lambda}{1 + \lambda^2}$$

за някакво реално число  $\lambda \neq 0$ .

**Упражнение 5.2.** Да се намерят необходими и достатъчни условия в термините на коефициентите  $z_1, z_2$  в (8) така, че  $\triangle ABC$  да е равнобедрен и правоъгълен с  $\sphericalangle A = 90^\circ$ .

**Отговор.**

$$z_1 = \frac{1 \mp i}{2}, z_2 = \overline{z_1}.$$

В следващата лема е намерен медицентърът на равностранныя триъгълник от Лема 5.1.

**Лема 5.2.** Ако  $\triangle ABC$  е равностраничен и равенството (8) е изпълнено с

$$z_1 = \frac{1}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2}, z_2 = \overline{z_1},$$

то за неговия медицентър имаме

$$\frac{a + b + c}{3} = w_1 b + w_2 c,$$

където

$$w_1 = \frac{(z_1 + 1)}{3}, w_2 = \frac{(z_2 + 1)}{3}.$$

Ние пропускаме доказателството на горното равенство.

Да отбележим, че от равенството (10) следва, че

$$w_1 + w_2 = 1. \quad (11)$$

Сега ще дадем по-точно описание на точките  $L, K, J$  на Фигура 1. На нея триъгълникът  $ABC$  е ориентиран по часовниковата стрелка и е важно да се отбележи, че  $\triangle ABJ$ ,  $\triangle BCL$  и  $\triangle CAK$  имат една и същата ориентация.

В сила е следната модификация на Лема 5.1 с отчитане на ориентацията.

**Лема 5.3.**  $\triangle ABC$  е равностранен с положителна ориентация (обратна на часовниковата стрелка) точно когато равенството (8) е изпълнено с

$$z_1 = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}, z_2 = \bar{z}_1.$$

Аналогично, Упражнения 5.1 и 5.2 приемат следния вид:

**Упражнение 5.3.**  $\triangle ABC$  е правоъгълен с  $\sphericalangle A = 90^\circ$  и положителна ориентация, точно когато

$$a = z_1 b + z_2 c,$$

където

$$z_1 = \frac{\lambda^2 - i\lambda}{1 + \lambda^2}, z_2 = 1 - z_1 = \frac{1 + i\lambda}{1 + \lambda^2}$$

за някакво реално число  $\lambda > 0$ .

**Забележка 5.3.** Равенството

$$a = \frac{\lambda^2 - i\lambda}{1 + \lambda^2} b + \frac{1 + i\lambda}{1 + \lambda^2} c$$

може да се запише във вида

$$a = \frac{1 + i\mu}{1 + \mu^2} b + \frac{\mu^2 - i\mu}{1 + \mu^2} c$$

след субституцията

$$\mu = -\frac{1}{\lambda}.$$

**Упражнение 5.4.**  $\triangle ABC$  е равнобедрен и правоъгълен с  $\sphericalangle A = 90^\circ$  и положителна ориентация, точно когато

$$a = \frac{1 - i}{2} b + \frac{1 + i}{2} c.$$

## Литература

- [1] A. Barlotti, *Una proprieta degli n-agoni che si ottengono trasformando in una affinata un n-agono regolare*, Boll.Un.Mat.Ital, **10** (1955), 96-98.
- [2] H. S. M. Coxeter, *Introduction to Geometry*, John Wiley & Sons, NY, 1961.
- [3] J. Douglas, *On Linear Polygon Transformation*, Bull Amer Math Soc, **46** (1940), 551 – 560.
- [4] R.H. Eddy and R. Fritsch, *The Conics of Ludwig Kiepert: A Comprehensive Lesson in the Geometry of the Triangle*, Math. Mag. **67**, (1994), 188 – 205.
- [5] S. B. Gray, *Generalizing the Petr-Douglas-Neumann Theorem on N-Gons*, The American Mathematical Monthly, **110(3)** (2003), 210 – 227.
- [6] L. Greber, *Napoleon's Theorem and the Parallelogram Inequality for Affine-Regular Polygons*, Amer. Math. Monthly, **87** (1980), 644-648.

- [7] B. Grunbaum, *Metamorphosis of Polygons*, in *The Lighter Side of Mathematics*, R.K.Guy and R.E.Woodrow (eds), MAA, 1994.
- [8] B. H. Neumann, *A Remark on Polygons*, *J London Math Soc*, **17** (1942), 165 – 166.
- [9] T. Pappas, *Napoleon's Theorem*, The Joy of Mathematics. San Carlos, CA: Wide World Publ./Tetra, 1989.
- [10] G. Polya, *Mathematical Discovery*, John Wiley & Sons, NY, 1981.
- [11] F. Schmidt, *200 Jahre französische Revolution-Problem und Satz von Napoleon*, *Didaktik der Mathematik* **19**, (1990) 15 – 29.
- [12] D. Wells, *You Are a Mathematician*, John Wiley & Sons, NY, 1981.
- [13] J.E. Wentzel, *Converses of Napoleon's Theorem*, *Amer. Math. Monthly* **99** (1992), 339 – 351.
- [14] [http : //www.cut – the – knot.org/Generalization/fermat\\_point.shtml](http://www.cut-the-knot.org/Generalization/fermat_point.shtml)